

CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DO GÊNERO *CUPHEA* ADANS

por

G. M. BARROSO

Chefe da Secção de Botânica Sistemática

Esse gênero, assim denominado em virtude da gibosidade do cálice, foi descrito por Adanson, em 1763.

Apresenta flôres zigomorfas, com cálice tubuloso, calcarado, estriado; pétalas 6-4-2 ou 0, iguais ou desiguais entre si, persistentes ou não na deiscência do fruto; estames 11-8-6 ou, raro, 4, concrecidos em tubo aderente às paredes do cálice; ovário séssil ou, apenas, em *C. santos-limae*, estipitado, provido ou não de disco dorsal ou cupuliforme; óvulos de número variável; fruto envolvido pelo cálice. Este, na maturação fende-se longitudinalmente no dorso e a placenta projeta-se em direção oblíqua, para trás, deixando que as sementes caiam pouco a pouco.

A ausência ou presença de bractéolas é caracter de importância sistemática neste gênero, e serve para subdividi-lo em dois subgêneros: *Lythrocuphea* e *Eucuphea*.

São ervas, subarbustos ou arbustos, geralmente de folhas decussadas, raramente, 3-5 verticiladas ou alternas.

No Brasil ocorrem cerca de 103 espécies, das quais, a maioria foi estudado por Koehne, em Flora Brasiliensis de Martius XIII. 2 e em Das Pflanzenreich IV. Helf. 17.

Ao estudarmos as espécies de *Cuphea*, de nosso Herbário, uma delas chamou-nos logo a atenção e não tivemos dúvida em classificá-la como nova. Batizamos-la *C. santos-limae*, em homenagem ao seu primeiro coletor, Dr. Santos Lima, farmacêutico e estudioso de nossa flora.

É um arbusto bastante ornamental, de flôres vermelhas, cuja diagnose damos a seguir:

Sect 10 — Melvilla

Series 1.

148a — CUPHEA SANTOS-LIMAE, sp. n. (Est. 1).

Frutex ramulis junioribus dense glanduloso-hirtellis, demum glabratis, foliis oppositis, petiolis 5 mm longis utrinque glanduloso-pilosis, penninerviis, integris, membranaceis, 37 mm longis, 17 mm latis, acutis; floribus oppositis, pedicellis ca. 7 mm mediis axis internodiis insertis, phophyllis ca. 1 mm gerentibus; calyce 25 mm. longo, externe glanduloso-hirtello, coccineo, fauce non dilatado, laciniis deltoidiis, interne exceptis pilis albis, longis inter laciniis, glabris; petalis 2 rotundatis, glabris, cocciniis, staminibus 11 glabris, subaequalibus, ca. 20 mm calicis tubo insertis; ovario stiptato styloque glaberrimis, disco cupuliforme vel annuliforme, ovulis numerosis.

TYPUS: RB 27 077 — *Cuphea santos-limae* sp. n.; Est. do Rio, Sta Magdalená, Serra da Fumaça, col. J. Santos Lima, 329 (19-11-1935).

Planta cultivada no Jardim Botânico.

Espécie próxima de *C. glaziovii*, mas dela se distinguindo pelo menor número de pétalas e pelo ovário estiptado.

CHAVE PARA DETERMINAR AS ESPÉCIES DO GÊNERO CUPHEA

- | | |
|---|------------------------|
| 1 — Bractéolas presentes (fig. I) | 15 |
| Bractéolas ausentes | 2 |
| 2 — Pedicelos alternos | 3 |
| Todos os pedicelos opostos | 4 |
| 3 — Fôlhas lineares ou lanceoladas | <i>C. anagalloidea</i> |
| Fôlhas ovais | <i>C. pascorum</i> |
| 4 — Estames exsertos | <i>C. punctulata</i> |
| Estames inclusos | 5 |
| 5 — Pétalas muito desiguais entre si (fig. IV) | <i>C. densiflora</i> |
| Pétalas iguais ou quase iguais entre si | 6 |
| 6 — Cálce até 10 mm de comprimento | 7 |
| Cálce com mais de 10 mm de comprimento | 11 |
| 7 — Fôlhas lineares ou lanceoladas | <i>C. fruticosa</i> |
| Sem êsse característico | 8 |

8 — Base da fôlha atenuada	9
Base da fôlha não atenuada	13a:
9 — Disco horizontal (fig. XIV)	10
Disco ereto ou quase ereto (fig. XIII)	12
10 — Planta ramosíssima; fôlhas até 1 cm de largura, cálice até 5 mm de comprimento	<i>C. ramosissima</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	<i>C. racemosa</i>
11 — Fôlhas glaucas, obtusas; lobo dorsal do cálice muito prolongado (fig. XVI)	<i>C. obtusifolia</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	<i>C. longiflora</i>
12 — Ovário glabro	<i>C. organifolia</i>
Ovário piloso	14
13a — Duas pétalas maiores que as demais (fig. IV)	<i>C. organifolia</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	13
13 — Fôlhas agudas	<i>C. Schwackei</i>
Fôlhas obtusas	<i>C. varia</i>
14 — Pétalas albas	<i>C. lindmaniana</i>
Pétalas não albas	<i>C. varia</i>
15 — Cálice até 11 mm de comprimento	16
Cálice com mais de 11 mm de comprimento	75a
16 — Pétalas persistentes no fruto (fig. VIII)	111
Pétalas deciduas no fruto	17
17 — Disco dorsal	18
Disco cupuliforme	<i>C. arenarioides</i>
18 — Estames iguais, quase iguais ou maiores que o tubo do cálice (fig. III)	28
Estames bem menores que o tubo do cálice (fig. II)	19
19 — Fôlhas verticiladas, lineares, até 1 mm de largura	<i>C. repens</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	20
20 — Disco ereto ou semi-ereto (fig. XIII)	21
Disco horizontal ou deflexo (figs. XIV, XV)	24
21 — Pecíolo até 3 mm de comprimento	23
Pecíolo com mais de 2 mm de comprimento	22
22 — Base da fôlha atenuada; até 3 óvulos no ovário	<i>C. affinitatum</i>
Base da fôlha não atenuada; mais de 3 óvulos no ovário	<i>C. circaeoides</i>
23 — Fôlhas inferiores, caulinares, arredondadas ou ovais suborbiculares	<i>C. mesostemon</i>
Sem êsse característico	<i>C. calophylla</i>
24 — Disco deflexo; até 3 óvulos no ovário	25
Disco horizontal	26

25 — Fôlhas até 1 mm de largura, sésseis	<i>C. tenuissima</i>
Sem o conjunto desses caracteres	<i>C. micrantha</i>
26 — Fôlhas até 5 mm de largura, com pêlos glandíferos dispostos nas margens	<i>C. fuscinervis</i>
Sem o conjunto desses caracteres	27
27 — Cálice frutífero em forma de garrafa (fig. VI)	<i>C. balsamona</i>
Sem esse característico	<i>C. aperta</i>
28 — Disco plano ou côncavo na parte superior e convexo na parte inferior (figs. XI-XII-XIII)	29
Disco semigloboso na parte superior e escavado na inferior (fig. XV)	97
29 — Os dois estames menores com anteras normais	31
Os dois estames menores transformados em estaminódios	30
30 — Folhas lineares de margem revoluta	<i>C. enneanthera</i>
Sem o conjunto desses caracteres	<i>C. retrorsicapilla</i>
31 — Sementes com carúncula	32
Sementes sem carúncula	34
32 — Cálice, abaixo dos estames, glabro; estilête glabro	<i>C. urbaniana</i>
Sem o conjunto desses caracteres	33
33 — Nervuras da fôlha muito pronunciadas ...	<i>C. carunculata</i>
Nervuras obscuras	<i>C. dusenii</i>
34 — Ovário giboso, sulcado longitudinalmente ..	<i>C. campestris</i>
Sem o conjunto desses caracteres	35
35 — Cálcar do cálice muito longo (fig. VII)	36
Cálcar do cálice curto	37a
36 — Fôlha linear subulada	<i>C. liniifolia</i>
Sem esse característico	<i>C. linarioides</i>
37a — Fôlhas maiores até 1,5 cm de comprimento	37
Fôlhas maiores com mais de 1,5 cm de comprimento	43
37 — Fôlhas aciculares	38
Fôlhas não aciculares	39
38 — Fôlhas com um sulco na página ventral, glabra; pétalas emarginadas	<i>C. emarginata</i>
Sem o conjunto desses caracteres	<i>C. acicularis</i>
39 — Fôlhas de margem revoluta	57
Fôlhas de margem plana	40
40 — Cálice com até 4 mm de comprimento	<i>C. brachyantha</i>
Cálice com mais de 4 mm de comprimento ..	41

41 — Fôlhas lanceoladas ou lineares, com pêlos rijos, glandulíferos, dispostos na margem e sôbre a nervura da fôlha	93
Sem o conjunto dêsses caracteres	42
42 — Fôlhas côncavas no dorso	<i>C. diosmifolia</i>
Sem êsse característico	44
43 — Bractéolas linear-subuladas ou lanceoladas, quase aristadas	<i>C. strigulosa</i>
Bractéolas ovais ou oblongas	45
44 — Planta viscosa	46
Planta não viscosa	50
45 — Ramos hispídos, com as cerdas superiores purpúreas	<i>C. ingrata</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	47
46 — Cálice com pêlos glandulíferos	55
Sem êsse característico	52
47 — Fôlhas lineares ou lanceoladas	48
Sem êsse característico	49
48 — Vesículas infra-estaminais pronunciadas (fig. V)	51
Sem êsse caráterístico	78
49 — Vesículas infra-estaminais pronouciadas (Fig. V)	54
Sem êsse característico	59
50 — Vesículas infra-estaminais pronunciadas; fôlhas membranáceas	<i>C. vesiculosa</i>
Sem êsse característico	53
51 — Tôdas as fôlhas lineares	70
Sem êsse característico	76
52 — Disco reflexo	64
Disco não reflexo	<i>C. glutinosa</i>
53 — Folhas uninervéas	56
Fôlhas não uninerveas	58
54 — Sementes retusas no ápice e com a margem muito espessada; estilête piloso	<i>C. polymorpha</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	82
55 — Fôlhas uninerveas mais ou menos adpresas	<i>C. paranensis</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	63a
56 — Ramos glabros; fôlhas com pêlos escabros dispostos nas margens	<i>C. pseudericoides</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	<i>C. paranensis</i>
57 — Fôlhas até 2 mm de largura, lineares, uninerveas	96
Sem o conjunto dêsses caracteres	60

58 — Até 3 óvulos no ovário; fôlhas rijas	61	
Sem o conjunto dêsses caracteres	62	
59 — Até 3 óvulos no ovário; fôlhas rijas	68	
Sem o conjunto dêsses caracteres	66	
60 — Ramos e fôlhas com pêlos hirsutos, densos, rufos		<i>C. burchellii</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres		<i>C. decipiens</i>
61 — Ramos e fôlhas com pêlos densos, hirsutos e rufos	85	
Sem o conjunto dêsses caracteres	67	
62 — Ramos e fôlhas com pêlos densos, hirsutos e rufos	86	
Sem o conjunto dêsses caracteres	65	
63a — Folhas coriáceas, reticuladas		<i>C. reticulada</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	63	
63 — Bordas da fôlha com cerdas glandulíferas ..		<i>C. acinifolia</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres		<i>C. pseudovaccinum</i>
64 — Cálice com pêlos longos, hirsutos, sem pêlos glandulíferos		<i>C. acinos</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres		<i>C. pseudovaccinum</i>
65 — Cálice com pêlos longos, hirsutos, sem pêlos glandulíferos		<i>C. acinos</i>
Se o conjunto dêsses caracteres		<i>C. pseudovaccinum</i>
66 — Até 5 óvulos no ovário	87	
Mais de 5 óvulos no ovário	71	
67 — Fôlhas com pêlos longos		<i>C. decipiens</i>
Sem êsse característico	94	
68 — Fôlhas com pêlos longos		<i>C. decipiens</i>
Sem êsse característico	69	
69 — Fôlhas reticuladas		<i>C. reticulata</i>
Sem êsse característico	84	
70 — Fôlhas membranaceas		<i>C. vesiculosa</i>
Fôlhas coriáceas		<i>C. sclerophylla</i>
71 — Fôlhas até 2 cm de comprimento; peciolo até 2 mm de comprimento	72	
Sem o conjunto dêsses caracteres	73	
72 — Fôlhas maiores até 1 cm de largura	88	
Fôlhas maiores com mais de 1 cm de largura	89	
73 — Inflorescência simples; peciolos com mais de 5 mm de comprimento		<i>C. tuberosa</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	74	
74 — Cálice com pêlos glandulíferos	79	
Sem êsse característico	90	

- 75a — Cálice rubro, coccineo ou sulfureo 115
Sem êsse característico 75
- 75 — Fôlhas maiores até 1 cm de largura; cálice,
abaixo dos estames, glabro *C. pterosperma*
Sem o conjunto dêsses caracteres 77a
- 76 — Cálice com pêlos hirsutos, longos 80
Sem o conjunto dêsses caracteres 81
- 77a — Pétalas persistentes no fruto *C. lutescens*
Sem êsse característico 77
- 77 — Ápice da semente obtuso; fôlhas decussadas
Ápice da semente emarginado; fôlhas verticil-
ladas *C. lysimachioides*
- 78 — Cálice até 6 mm; fôlhas glabras, opostas .. *C. rubescens*
Sem o conjunto dêsses caracteres 83
- 79 — Fôlhas verticiladas *C. lysimachioides*
Fôlhas decussadas *C. tuberosiformis*
- 80 — Fôlhas opostas *C. polymorpha*
Fôlhas verticiladas *C. spermacoce*
- 81 — Disco globoso, horizontal; sementes aladas .. *C. pterosperma*
Sem o conjunto dêsses caracteres *C. spermacoce*
- 82 — Cálice, interiormente, abaixo dos estames,
com pêlos esparsos ou densos 91
Cálice, interiormente, abaixo dos estames, bis-
seriado viloso (fig. V) *C. polymorphoides*
- 83 — Óvulos 3; fôlhas com pêlos glandulíferos, dis-
postos nas margens e nervura central da
fôlha *C. excoriata*
Sem o conjunto dêsses característicos 95
- 84 — Cálice com pêlos curtos, glandulíferos *C. pseudovaccinum*
Sem o conjunto dêsses caracteres *C. ferruginea*
- 85 — Fôlhas opostas, até 2 cm de comprimento
e 6 mm de largura *C. burchellii*
Sem o conjunto dêsses caracteres *C. ferruginea*
- 86 — Fôlhas opostas, até 2 cm de comprimento e
6 mm de largura *C. burchellii*
Sem o conjunto dêsses caracteres *C. ferruginea*
- 87 — Cálice com pêlos curtos, glandulíferos *C. pseudovaccinum*
Sem o conjunto dêsses caracteres *C. ferruginea*
- 88 — Tôda a planta ferruginea-pilosa, não viscosa *C. ferruginea*
Sem o conjunto dêsses caracteres *C. acinifolia*
- 89 — Cálice até 9 mm de comprimento, cálice abai-
xo dos estames, glabro ou bisseriado viloso
(fig. V) *C. ferruginea*
Sem o conjunto dêsses caracteres *C. tuberosiformis*

90 — Tôda a planta ferruginea-pilosa; pedicelos com mais de 3 mm de comprimento	<i>C. ferruginea</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	<i>C. confertiflora</i>
91 — Planta hirsuta	<i>C. remotiflora</i>
Planta não hirsuta	<i>C. spermacoe</i>
92 — Fôlhas coriáceas, de margem revoluta	<i>C. crulsiana</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	<i>C. tuberiformis</i>
93 — Fôlhas uninerveas, opostas, não adpressas; mais de 3 óvulos no ovário	<i>C. thymoides</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	<i>C. erectifolia</i>
94 — Fôlhas adpressas, até 1,2 cm de comprimento	<i>C. erectifolia</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	<i>C. pseudovaccinum</i>
95 — Cálice, interiormente, bisseriado piloso (fig. V), fôlhas uninerveas	<i>C. hyssopoides</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	<i>C. lysimachioides</i>
96 — Cálice até 6 mm de comprimento; cálice, abaixo dos estames, bisseriado piloso (fig. V)	<i>C. disperma</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	<i>C. sperguloides</i>
97 — Cálcar tão comprido ou mais comprido que largo, dilatado próximo ao pedicelo	106
Sem o conjunto dêsses caracteres	98
98 — Base da fôlha cordiforme	99
Base da fôlha não cordiforme	103
99 — Fôlhas eretas ou patentes	101
Fôlhas reflexas	100
100 — Caule e ramos com pêlos longos, hirsutos, lanuginosos	<i>C. reflexifolia</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	<i>C. melampyrifolia</i>
101 — Nervuras salientes na página dorsal	123
Sem êsse característico	102
102 — Fôlhas hirsutas nas duas faces, até 6 mm de largura, ramos hirsutíssimos	<i>C. impeza</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	<i>C. glauca</i>
103 — Ramos patentes	<i>C. patula</i>
Ramos não patentes	104
104 — Par de fôlhas superiores muito desiguais entre si, isto é, uma das fôlhas semelhante às inferiores e outra, muito menor, lanceolada ou linear	<i>C. inaequalifolia</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	105
105 -- Fôlha longo acuminada	<i>C. antispyhyllitica</i>
Sem êsse característico	<i>C. gracilis</i>
106 — Flôres amarelas	107
Flôres não amarelas	108

107 — Fôlhas opostas	<i>C. flava</i>
Fôlhas verticiladas	<i>C. brachiata</i>
108 — Fôlhas lineares, até 2 mm de largura	109
Sem o conjunto dêsses caracteres	110
109 — Fôlhas de margem revoluta	<i>C. laricoides</i>
Fôlhas de margem não revoluta	<i>C. ericoides</i>
110 — Fôlhas sêsseis, subcoriáceas, escabras na pá- gina superior	<i>C. sessilifolia</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	<i>C. ramulosa</i>
111 — Pecíolos até 3 mm de comprimento	<i>C. sessilifolia</i>
Pecíolos com mais de 3 mm de comprimento	112
112 — Base da fôlha aguda ou atenuada	113
Base da fôlha arredondada	<i>C. lutescens</i>
Base da fôlha cordiforme	<i>C. costata</i>
113 — Plantas com pêlos glandulíferos	114
Sem êsse característico	<i>C. impatientifolia</i>
114 — Ervas; estames inclusos	<i>C. parietarioides</i>
Arbustos, estames exsertos	<i>C. prunellifolia</i>
115 — Flôres alternas	118
Flôres opostas ou verticiladas	116
116 — Disco anular; ovário glabro	124
Disco dorsal; ovário piloso	117
117 — Flôres verticiladas; fôlhas lineares	<i>C. cuiabensis</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	<i>C. speciosa</i>
118 — Cálice até 17 mm de comprimento	119
Cálice com mais de 17 mm de comprimento ..	120a
119 — Péciolo até 6 mm de comprimento; base da fôlha arredondada	<i>C. fuchsifolia</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	125
120a — Ovário giboso no dorso, abaixo da giba, bifo- veolado	<i>C. hybogyna</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	120b
120b — Cálice, abaixo dos estames, glabro	<i>C. grandiflora</i>
Sem êsse característico	120
120 — Cálice provido internamente, na base, de um anel de pêlos crespos	<i>C. anulata</i>
Sem êsse característico	121
121 — Fôlhas sêsseis; pétalas nulas	<i>C. pulchra</i>
Sem êsse conjunto dêsses caracteres	122
122 — Filêtes dos estames medianos muito mais compridos que os outros, excedendo de 1 mm o estilêto exserto	<i>C. loefgrenii</i>
Sem o conjunto dêsses caracteres	126

- 123 — Cálice com pêlos longos *C. radula*
 Sem êsse característico *C. antisiphylitica*
- 124 — Pétalas 6; ovário séssil (fig. IX) *C. glaziovii*
 Pétalas 2; ovário estipitado (Est. 1) *C. santos-limae* sp. n.
- 125 — Lobo dorsal do cálice maior que os demais,
 (fig. XIV), pétalas maiores arredondadas,
 purpureas *C. lanceolata* (x)
 Sem o conjunto dêsses caracteres 127
- 126 — Lobo dorsal do cálice maior que os demais;
 pétalas maiores arredondadas, purpureas .. *C. lanceolata* (x)
 Sem o conjunto dêsses caracteres *C. gardneri*
- 127 — Cálice glabro; pétalas nulas *C. platycentra* (x)
 Sem o conjunto dêsses caracteres *C. warmingii*

LISTA DAS ESPÉCIES DE *CUPHEA* ADAMS., INDÍGENAS E EXÓTICAS,
 NO BRASIL

Subg. I — *Lythrocuphea* Koehne

Sec. 1 — *Archocuphea* Koehne

- 2 — *C. anagalloidea* St.-Hil Ceará, Piauí, Goiás, Minas
 Gerais e Bahia.
 var. *a. subsimplex* Koehne Brasil-Central, Goiás, Ceará,
 sul do Piauí, Bahia.
 var. *β dumosa* Koehne Alagoas.
- 3 — *C. pascuorum* Koehne Piauí, Bahia.

Sec. 2. — *Enaticuphea* Koehne

- 5 — *C. fruticosa* Spreng. Brasil, Uruguai, Argentina.
 Subsp. 1. *fruticosa* Koehne Brasil, Uruguai, Argentina.
 var. *a. typica* St.-Hil.
 var. *β. chamaedendrum* St.-Hil.
 var. *μ. rosmarinifolia* St.-Hil.
 Subsp. 2. *hilaireana* Koehne Rio Grande do Sul, Uruguai,
 Argentina.
 var. *δ. epilobioides* St.-Hil.
 var. *ε. megapotamica* (Spreng.)
 Koehne
- 6 — *C. racemosa* (L.f.) Spreng Cuba, México, Colômbia, Pa-
 raguai, Equador, Brasil (San-
 ta Catarina, Pará, Bahia até
 Rio de Janeiro, Rio Grande
 do Sul, Minas Gerais).

var. α . *tropica* Cham. et Schlechtd.
var. β . *extrotropica* Cham. et Schlechtd.

- 7 — *C. organifolia* Cham. et Schl. Sul do Brasil, Minas Gerais, Uruguai, Paraguai.
var. α . Koehne S. Paulo, Rio Grande do Sul, Uruguai.
var. β . *organifolia* s. trg. Koehne .. Santa Catarina, Rio Grande do Sul
var. μ . *minor* Koehne S. Paulo, Rio Grande do Sul, Corrientes, Entrerios.
var. δ . *gracillima* St.-Hil. Minas Gerais, Santa Catarina, Norte e sul do Paraguai.
var. ϵ . *ramosio* Koehne São Paulo.
- 8 — *C. longiflora* Koehne Minas Gerais, S. Paulo, Paraguai, Corrientes, Uruguai.
- 8a — *C. obtusifolia* Koehne, Contrib Gray Herb. n.s.XCV.5 (1931) 5 Paraná (Dusen, 7782) .
- 9 — *C. densiflora* Koehne Minas Gerais.
- 10 — *C. punctulata* Koehne Piauí, Bahia, Paraguai.
- 11 — *C. ramosissima* Koehne Inhumas (Pohl 3218) .
- 11a — *C. lindmaniana* Koehne, Contrib. Gray Herb. XCV.6 (1931) Paraná (Dusen 7156) .
- 11b — *C. varia* Koehne, 1.c. Paraná (Dusen, s.n., 8-1-911).
- 16 — *C. schwackii* Koehne Minas Gerais.

Subg. II — *Eucuphea* Koehne

Grex B. — *Aphananthae* Koehne

Sect. 4 — *Melicyanthium* Koehne

- 30 — *C. arenarioides* St. Hil. Goiás, Minas Gerais, S. Paulo.
var. α . *myriophylloides* (St.-Hil.) Koehne
var. β . *muscosa* St.-Hil. Minas Gerais, S. Paulo.

Sect. 5 — *Brachyandra* Koehne

Subs. 1 — *Microcuphea* Koehne

- 31 — *C. repens* Koehne Venezuela, Brasil (Mato Grosso, Goiás, S. Paulo) .

Subs. 2 — *Melanium* (P. Browne)

Koehne

Series 1 —



- 32 — *C. callophylla* Cham. et Schlechtd ... Minas Gerais, Espirito Santo,
Rio de Janeiro, Santa Cata-
rina.
var. *a. callophylla* sensu stricto, Koeh-
ne
- 33 — *C. mesostemon* Koehne Minas, S. Paulo, Paraná, Pa-
raguai, Argentina, Bolívia.
- 41 — *C. fuscinerervis* Koehne Minas Gerais.

Series 4.

subs. 3. *Micranthium* Koehne

- 43 — *C. micrantha* H.B.K. Antilhas, Venezuela, Guiana
Inglêsa, Brasil (Piauí, Bahia,
Minas Gerais, Goiás).
- 44 — *C. tenuissima* Koehne Goiás.
- 45 — *C. affinitatum* Koehne Piauí.

subs. 4. *Lophostomopsis*

- 47 — *C. circaeoides* Smith Pernambuco, Minas Gerais.
- 51 — *C. balsamona* Cham. et Schlechtd ... Antilhas, Colômbia, Venezue-
la, Guiana Francesa, Brasil
(Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais, Goiás, S. Paulo, Santa
Catarina), Paraguai, Ilhas
Galapos, Ilhas Sandwich.
- 52 — *C. aperta* Koehne Rio de Janeiro, Minas Gerais.

Subs. 1. *Platypterus* Koehne

- 53 — *C. campestris* Koehne Piauí, Bahia, Rio de Janeiro.
var. β . *brachystemon* Koehne Rio de Janeiro.
- 54 — *C. strigulosa* H.B.K. Antilhas, Brasil (Bahia, Rio
de Janeiro).

subsp. 1. *opaca* Koehne

subsp. 2. *nitens* Koehne

- 55 — *C. ingrata* Cham. et Schlechtd Minas Gerais, Rio de Janeiro,
S. Paulo, Sta. Catarina, Rio
Grande do Sul, Paraguai,
Uruguai.
- 57 — *C. acinifolia* St. Hil. S. Paulo, Paraná.
- 57a — *C. concinna* Koehne, Bot. Janrb. XLI
(1908) 85 Bahia (Ule, 6974).

- 58 — *C. thymoides* Cham. et Schlechtd ... Bolívia, Brasil (Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, provavelmente, Paraná), Argentina.
- 60 — *C. urbaniana* Koehne S. Paulo, Sta. Catarina, Paraná.
- 60a — *C. dusenii* Koehne, Bot. Jahrb. 42 (1909) Beibl. 97 Paraná (Dusen, 4299).
- 60b — *C. carunculata* Koehne, 1. c. Paraná, (Dusen, 4300).
- 63 — *C. rubescens* Koehne Bahia.

Subs. 3. *Pachypterus* Koehne

- 66 — *C. polymorpha* St. Hil. Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Paraguai.
- var. *a. phillyreoides* St.-Hil Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo.
- var. *β. oxycoccus* St.-Hil. Minas Gerais, S. Paulo.
- var. *γ. vincooides* St.-Hil. Minas Gerais, Paraguai.
- var. *δ. prostrata* St.-Hil. São Paulo.
- 67 — *C. vesiculosa* Koehne Minas, S. Paulo.

Subs. 4. *Hilariella* Koehne

Series 1.

- 68 — *C. acinos* St. Hil Minas, S. Paulo.
- 68a — *C. paranensis* Cacigalupi, Contrib. Gray Herb. XCV. (1931) 15 Paraná (Dusen 17381).
- 69 — *C. polymorphoides* Koehne Brasil Oeste.
- 70 — *C. decipiens* Koehne Goiás.
- 71 — *C. burchellii* Koehne Goiás.
- 72 — *C. pseudovaccinium* St. Hil. Goiás, Minas Gerais.
- var. *a.* Goiás, Minas Gerais.
- var. *β.* Minas Gerais.
- 73 — *C. reticulata* Koehne Minas Gerais.
- var. *a.*
- var. *β.*
- 74 — *C. sclerophylla* Koehne Minas Gerais.
- 76 — *C. brachyantha* Koehne Piauí.
- 77 — *C. disperma* Koehne Goiás, Minas Gerais.
- 78 — *C. diosmifolia* St.-Hil. Minas Gerais.
- 79 — *C. pseudericooides* Koehne Minas Gerais.
- 80 — *C. emarginata* Koehne Goiás.
- 81 — *C. acicularis* Koehne Goiás.




Series 2

- 82 — *C. linarioides* Cham. et Schlechtd ... Goiás, Minas, S. Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Argentina.
- 83 — *C. linifolia* (St.-Hil.) Koehne São Paulo, Paraná.
var. α . *linifolia* (St.-Hil. sens. strict.)
Koehne São Paulo.
var. β . *hervita* (St.-Hil.) Koehne .. São Paulo.
var. γ . *helicophora* Koehne Paraná.

Subs. 5. *Oidemation* Koehne

Series 1

- 84 — *C. tuberosa* Cham. et Schlechtd Rio Grande do Sul, Paraguai.
- 84a — *C. tuberosiformis* Koehne, Contrib.
Gray Herb. XCV (1931) 16 Paraná (Dusen 7281, 9142, 16316, G. Jonsson, 1201a).
- 85 — *C. confertiflora* St.-Hil. S. Paulo, Argentina, Paraguai.
- 87 — *C. pterosperma* Koehne Minas Gerais, Paraguai.
- 88 — *C. lysimachioides* Cham. et Schlechtd Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina.
- 89 — *C. spermacoce* St.-Hil. Goiás, Minas, Bahia, Rio Grande do Sul.
var. α Goiás, Minas Gerais, Bahia.
var. β . *elongata* Koehne Goiás, Minas Gerais.
var. γ . *angustata* Koehne Minas Gerais, Rio Grande do Sul.
- 90 — *C. excoriata* Koehne Minas Gerais.
- 91 — *C. ferruginea* Koehne Goiás.
var. β . *acuminata* Koehne Brasil.
- 91a — *C. myrtifolia* Bacigalupi, Contrib.
Gray Herb. XCV (1931) 17 Mato Grosso (Malme, 12-5-1903 e 13-X-1902).
- 93 — *C. remotifolia* Koehne Goiás.
- 94 — *C. crulsiana* Koehne Goiás.
- 95 — *C. erectifolia* Koehne Minas Gerais.
- 96 — *C. hyssopoides* St. Hil. Minas Gerais.
- 98 — *C. sperguloides* St. Hil. Minas Gerais.
- 99 — *C. retrosicapilla* Koehne Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais.
- 100 — *C. enneanthera* Koehne Goiás.



Sect. 7. *Trispermum* Koehne

- 102 — *C. gracilis* H.B.K. Minas, São Paulo.
var. γ . *major* Koehne
103 — *C. antisiphilitica* H.B.K. Colômbia, Venezuela, Brasil
(Amazonas, Pará, Goiás,
Bahia, S. Paulo).
104 — *C. patula* St.-Hil. Goiás, S. Paulo, Rio de Ja-
neiro.
105 — *C. inaequalifolia* Koehne Bolívia, Brasil (Goiás), Pa-
raguai.
106 — *C. radula* (St.-Hil.) Koehne Maranhão, Goiás, Minas Ge-
rais.
107 — *C. glauca* Koehne Piauí, Bahia, Minas Gerais.
108 — *C. impeza* Koehne Piauí.
109 — *C. reflexifolia* Koehne Goiás.
110 — *C. melamphyrifolia* Koehne Minas Gerais.

Series 9.

- 111 — *C. ramulosa* Koehne Pará.
112 — *C. sessilifolia* Mart. Bahia.
var. α . *pilosa* Koehne Bahia.
var. β *strigosa* Koehne Bahia.
113 — *C. ericoides* Cham. et Schelechtd Bahia, Minas Gerais.
var. α Bahia.
var. β . *pithyusa* St.-Hil. Minas Gerais.
var. γ . *juniperina* St. Hil. Minas Gerais.
var. δ . *laxa* Koehne Bahia (Ule, 7326, em parte).
var. ϵ . *oxycedrina* Koehne Bahia (Ule 7325)
114 — *C. laricoides* Koehne Piauí.

Series 3.

- 115 — *C. brachyata* Koehne Alagoas, Bahia.
116 — *C. flava* Spreng Pernambuco, Bahia, Rio de
Janeiro, Paraguai.

Sect. 8. *Pseudocircaea* Koehne

- 120 — *C. sessiliflora* St. Hil. Minas Gerais.
122 — *C. prunellifolia* St. Hil. Bahia, Rio de Janeiro.
123 — *C. impatientifolia* St. Hil. Minas Gerais.
124 — *C. parietarioides* St. Hil. Minas Gerais.
125 — *C. lutescens* Koehne Goiás, Minas Gerais, Rio de
Janeiro, S. Paulo.

- var. *a. microcalyx* Koehne Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, S. Paulo.
var. *β. macrocalyx* Koehne Minas Gerais, São Paulo.
126 — *C. costata* Koehne Minas Gerais, Santa Catarina.

Grex. *Cosmanthae* Koehne
Sect. 9 *Heterodon* Koehne
Subs. 1 *Lophostomum* Koehne

Series 2.

- 133 — *C. lanceolata* Ait. México (Cultivada no J.B.).

Sect. 10. *Mellvilla* Koehne
Subs. 1. *Eumelvilla* Koehne

Series 1.

- 148 — *C. glaziovii* Koehne Santa Catarina.
148a — *C. santos-limae* G. M. Barroso, n. sp. Rio de Janeiro.

Series 2.

- 149 — *C. speciosa* (Anders) O. Ktze Venezuela, Guiana Inglesa, Equador, Brasil (Amazonas, Pará, Goiás, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, S. Paulo), Paraguai, Argentina.
150 — *C. cuiabensis* Mart. Mato Grosso.

Subs. 5. *Pachycalyx* Koehne

Series 1.

- 156 — *C. warmingii* Koehne Minas Gerais, S. Paulo, Rio de Janeiro.
var. *α.* Minas Gerais, S. Paulo.
var. *β. denudata* Koehne Rio de Janeiro.
157 — *C. fuchsiiifolia* St. Hil Minas Gerais.

Series 2.

- 158 — *C. gardneri* Koehne Goiás.
158a — *C. loefgrenii* Bacigalupi, Contr. Gray
Herb. XCV (1931) 24-25 Ceará (Alberto Loefgreen, 256 e 332).

- 159 — *C. grandiflora* Koehne Rio de Janeiro, Minas Gerais.
var. α Rio de Janeiro.
var. β . *fecunda* Koehne Minas Gerais.
160 — *C. annulata* Koehne Amazonas.

Series 3.

- 161 — *C. hybogyne* Koehne Minas Gerais.

Series 4.

- 162 — *C. pulchra* Moricand Bahia.


Subs. 6. *Erythrocalyx* Koehne

Series 3.

- 171 — *C. platycentra* Lemaire (x) México, Jamaica (Cultivada no J.B.).


BIBLIOGRAFIA

- BACIGALUPI, Rimo — (1931) I. Taxonomic Studies in *Cuphea*, in Contrib. Gray Herbar. n.s. Harv. Univ. XCV. 3-26. I-V plates, vol. 5 part. II.
KOEHNE, Bernardus Adalbertus Aemilius — (1875)-1882) — Lythraceae, in Fl. Bras. Mart. XIII. 2. 188-370 Tab. 30-67.
KOEHNE, E. (1903) — Lythraceae, in Das Pflanzr. IV. 216 Helf. 17 1-326.





Est. 1 — *Cuphea santes-limac*, sp. n.



F. Manhã.

I. Bractéolas presentes; II. Tubo estaminal menor que o cálice; III. Tubo estaminal do mesmo tamanho ou quase do mesmo tamanho que o cálice; IV. Pétalas desiguais entre si; V. Vesículas infra-estaminais e pêlos biscriados; VI. Cálice frutífero lagenariforme; VII. Calcar do cálice muito longo; VIII. Pétalas persistentes; IX. Disco anuliforme; X. Idem; XI. Disco lateral, escavado na parte ventral e côncavo na dorsal; XII. Disco deflexo; XIII. Disco ereto; XIV. Disco horizontal; XV. Disco subgloboso na parte ventral e escavado na dorsal; XVI. Um dos lobos do cálice maior que os demais.

NOTICIÁRIO

A 9 de janeiro de 1953, com 77 anos de idade, faleceu, em Berlim, o Prof. ROBERT PILGER, ex-diretor do Museu e Jardim Botânico do Berlin-Dahlem.

Nascido a 3 de julho de 1876, na ilha de Heligoland, no Mar do Norte, colou grau de Doutor em Filosofia a 23 de fevereiro de 1898, tendo cursado a Universidade de Berlim e feito um estágio, em Genebra, com o Prof. R. CHODAT.

Veio ao Brasil, pela primeira vez, em 1899, como um dos membros da expedição Mato Grosso-Xingu, chefiada pelo Dr. HERMANN MEYER. Nessa ocasião, coligiu cerca de 700 espécimens de nossa flora fanerogâmica, além de muitos criptógamos.

Em 1934, a convite do Governo brasileiro, voltou PILGER ao Brasil, para tomar parte na solenidade da inauguração do busto de von MARTIUS, numa das principais aléias do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Durante essa última estada, visitou São Paulo e a Estação Biológica do Itatiaia, tendo sido agraciado com o Ordem do Cruzeiro do Sul e eleito Membro Honorário do Conselho Técnico do Instituto de Biologia Vegetal.

Dirigiu o Museu e Jardim Botânico de Berlim-Dahlem, de 1945 a 1951, quando foi aposentado por ter atingido o limite de idade.

Como contribuição ao estudo de nossa flora, deixou os trabalhos: "Beitrag zu Flora von Matto Grosso, Botanische Bericht über die Expedition von Dr. HERMANN MEYER nach Central-Brazilien" (1901), "Beitrag zu Flora der Hylaea" (1905), e muitas descrições de plantas indígenas.